

CEFA-MILK® FORTE

Suspensión Intramamaria

Infusión antibiótica-antiinflamatoria para vacas en lactación



Formulación

Cefalexina monohidrato, (Base) 20 mg, Gentamicina sulfato, (Base) 10 mg, dexametasona 21 fosfato 0,075 mg, vitamina A 1 000 UI, excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento de las mastitis en bovinos, ovinos y caprinos en producción láctea, causadas por gérmenes sensibles a la cefalexina y/o gentamicina. Posee potente acción antiinflamatoria y está adicionado con vitamina A como regenerador epitelial de la glándula mamaria. El exclusivo sistema Duo Cap® ofrece la posibilidad de realizar una aplicación profunda o una administración cercana al esfínter del pezón.

Dosis y Administración

Bovinos: 1 jeringa/cuarto afectado cada 12 a 24 horas durante 2 días o hasta la recuperación completa; ovinos y caprinos: 1/2 jeringa/cuarto afectado cada 12 a 24 horas durante 2 días o hasta la recuperación completa. Aplicar vía infusión intramamaria.

Presentación Comercial

Envase plástico x 48 jeringas de 10 mL.,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.03.05.N.0595



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.