

CEFQUINOX® LC

Suspensión Intramamaria

Cefalosporina de Cuarta Generación Contra Todas las Bacterias Relevantes Causantes de Mastitis Bovina



Formulación

Cada jeringa de 8 g contiene: Cefquinoma (como sulfato) 75 mg, Excipientes c.s.p. 8 g.

Indicaciones

Para el tratamiento de la mastitis clínica y subclínica en vacas en lactación causada por bacterias sensibles a la cefquinoma, a saber, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Escherichia coli (y otras enterobacterias).

Dosis y Administración

Cefquinox® LC se administra por vía intramamaria. Una jeringa por cuarto afectado cada 12 horas durante 3 ordeños sucesivos. Ordeñe los cuartos afectados y descarte la leche. Después de limpiar y desinfectar a fondo el pezón y el orificio del pezón, infunda suavemente el contenido de una jeringa en el canal del pezón de cada cuarto afectado. Dispersar el producto mediante suaves masajes en el pezón y ubre del animal afectado. El contenido de una jeringa debe infundirse suavemente en el pezón del cuarto infectado cada 12 horas después de cada uno de los tres ordeños sucesivos. Adoptar precauciones para evitar que la cánula de la jeringa se contamine.

Presentación Comercial

Contenedor x 48 jeringas x 3 g,

Registro Senasa

Perú: F.082.005.I.00996.



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.