

ENRO-TABS® 50 FT

Tabletas Palatables

Antibiótico fluoroquinolónico palatable de alta biodisponibilidad



Formulación

Cada tableta contiene: Enrofloxacin 50 mg, Saborizantes y Excipientes c.s.p. 1 tableta

Indicaciones

Enro-Tabs® 50 FT Tabletas Palatables está indicado para su uso en el tratamiento de infecciones bacterianas -asociadas con bacterias susceptibles a la enrofloxacin- en: Tracto digestivo: causadas por *E. coli*, *Salmonella*, *Proteus* spp. Tracto Respiratorio: causadas por *Pasteurella* spp., *Bordetella* spp., *Klebsiella* spp. Tracto Urogenital: nefritis, pielonefritis, cistitis (*E. coli*, *Corynebacterium piogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp., *Pseudomona aeruginosa*). Heridas infectadas y septicemias. Infecciones cutáneas: dermatitis, piodermas, (*E. coli*, *Klebsiella* spp., *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp., *Pseudomona aeruginosa*). Infecciones del conducto auditivo externo: otitis (*E. coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp., *Pseudomona aeruginosa*).

Dosis y Administración

Vía oral. Una tableta de 50 mg por cada 10 kg de peso durante 3 a 5 días, directamente en la boca del animal o mezclada con el alimento.

Presentación Comercial

Caja x 10 tabletas, Caja x 30 tabletas,

Registro Senasa

Reg. SENASA Peru: F.82.31.I.0499



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.