

## HEMO-STOP® TABS

### Tableta Oral

Antihemorrágico, hemostático plaquetario con factor antifibrinolítico



### Formulación

Cada tableta contiene: Etamsilato BP 250.00 mg, ácido tranexámico 250.00 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta

### Indicaciones

Coadyuvante en el tratamiento y control de hemorragias. Control de la hemostasia en procesos traumáticos, quirúrgicos, patológicos y manipulaciones obstétricas. Profilaxis hemorrágica pre, trans y post quirúrgica (especialmente en ginecología, urología y odontología). Control de la hemorragia uterina disfuncional, coadyuvante en el tratamiento de trastornos de la coagulación y prevención de hemorragias de pequeños vasos sanguíneos, hematuria, melena, hematemesis, epistaxis, parvovirus, auriculohematomas, caudotomía, auriculotomía, metrorragias, elitrorragias, oncotomías, intoxicación por AINEs, perforación de úlcera gástrica y duodenal, peritonitis traumática, equimosis, púrpura, hemorragias post quirúrgicas, entre otras.

### Dosis y Administración

Caninos: Vía oral, a razón de 1/2 tableta por 10 a 12.5 kg cada 6 a 8 horas hasta que el efecto deseado sea alcanzado. Administrar por 1 a 5 días, hasta controlarel sangrado o a criterio del médico veterinario. En cirugía: Preoperatorio: 1 hora antes de la cirugía. Posoperatorio: cada 6 a 8 horas mientras persista el riesgo de hemorragia.

### Presentación Comercial

Caja x 30 tabletas,

### Registro Senasa

SENASA Perú. No. 3111001. Información informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.