

KANACEF® LC

Suspensión Intramamaria

Asociación sinérgica
betalactámica-aminoglucósido de amplio espectro
para el tratamiento de la mastitis bovina



Formulación

Cada jeringa de 10 g contiene: Cefalexina (como monohidrato) 200 mg, Kanamicina sulfato 100 000 UI, Excipientes c.s.p. 10 g

Indicaciones

Tratamiento de mastitis clínica en vacas lecheras lactantes causada por bacterias sensibles a la combinación de cefalexina y kanamicina como *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* y *Escherichia coli*.

Dosis y Administración

Kanacef® LC se administra por vía intramamaria. Una jeringa por cuarto afectado cada 24 horas, hasta que desaparezcan los síntomas, en la práctica dos aplicaciones. Ordeñe los cuartos afectados y descarte la leche. Después de limpiar y desinfectar a fondo el pezón y el orificio del pezón, infunda suavemente el contenido de una jeringa en el canal del pezón de cada cuarto afectado. Dispersar el producto mediante suaves masajes en el pezón y ubre del animal afectado. El contenido de una jeringa debe infundirse suavemente en el pezón del cuarto infectado cada 24 horas por dos días sucesivos. Adoptar precauciones para evitar que la cánula de la jeringa se contamine.

Presentación Comercial

Contenedor x 48 jeringas x 10 g,

Registro Senasa

Perú: F.082.005.I.00995.



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.