

## NO FLY

Insecticida

Mosquicida



### Formulación

Imidacloprid 0.5 g, Z-(9)-Tricoseno 0.1 g, Benzoato de denatonio 0.01 g, excipientes c.s.p. 100 g.

### Indicaciones

Aplicar sobre superficies y áreas donde se encuentren los insectos, tales como paredes, puertas, ventanas, etc. No-Fly ha sido desarrollado para uso en interiores como en exteriores, en el ámbito pecuario. Se recomienda aplicar el producto en épocas de proliferación de insectos.

### Dosis y Administración

Acción de choque: cada 15 - 21 días; mantenimiento: cada 30 - 45 días. El intervalo puede variar dependiendo del nivel y grado de la plaga a tratar. Cebo por espolvoreo: Colocar los gránulos (15 - 20 g en un recipiente plano cada 10 m<sup>2</sup> en lugares donde posan las moscas. Puede ser empleado en presencia de animales (colocándolo en lugares de difícil acceso). El cebo aumenta su capacidad de atracción y mayor efecto letal si se humedece ligeramente. Cebo disuelto en agua: Diluir 100 g de producto en 100 mL de agua y dejarla reposar 15 minutos; utilizando pulverizador o bomba de presión, aplicar la solución dentro de las 7 - 8 horas siguientes a la preparación sobre las superficies donde posan las moscas (mantener alejados a los animales). Cebo para pintar: Diluir 200 g de producto en 150 mL de agua y dejar reposar 20 minutos; por medio de pinceles o brochas, aplicar dentro de las 7 - 8 horas siguientes a la preparación sobre superficies no porosas donde las moscas posan. Se pueden preparar trampas, humedeciendo paneles de madera o cartón con la mezcla, colgados sobre los lugares frecuentados por los insectos.

### Presentación Comercial

Sobre x 250 g, Sobre x 1 kg, Sobre x 20g,



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

### Registro Senasa