

SUPRIVAN®

Emulsión Inyectable

Anestésico Hipnótico de Corta Acción para uso Intravenoso



Formulación

Propofol 10 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Está indicado como anestésico general en procedimientos quirúrgicos de periodos cortos en perros y gatos. En cirugías de larga duración puede usarse para inducir y mantener la anestesia con infusiones continuas de la droga. En caso de uso de anestesia inhalatoria, puede utilizarse como inductor de la anestesia general para la entubación endotraqueal. Puede usarse como anestésico en caso de diagnóstico ambulatorio o procedimientos menores (reparación de laceraciones, procedimientos radiológicos, odontología menor, biopsias menores, endoscopia, entre otros). Adicionalmente puede ser administrado para el tratamiento del estado refractario epiléptico.

Dosis y Administración

Administrar únicamente por vía inyectable intravenosa. La dosis de inducción en perros cuando no se usa un preanestésico es de 5.5 a 7.0 mg/kg (en la práctica 1 mL/1.4 a 1.8 kg), mientras que en gatos es de 8 a 13.2 mg/kg (en la práctica 1 mL/0.75 a 1.25 kg). Las dosis con diferentes preanestésicos xilacina, acepromacina, medetomidina, ketamina entre otros se reducen drásticamente. Otras especies animales: entre 3 y 15 mg/kg

Presentación Comercial

Frasco x 20 mL, Frasco x 30 mL, Frasco x 50 mL,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.82.42.I.0107



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.