

TYLAMOX® WS

Polvo Soluble

Asociación Antibiótica Sinérgica – Aditiva
Macrólido- Betalactámica de Amplio Espectro



Formulación

Cada 100 g contiene: Tilosina como tartrato 50 g, Amoxicilina como trihidrato 10 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes sensibles: infecciones del aparato respiratorio, digestivo, urogenital e infecciones de piel y tejidos blandos y prevención de infecciones bacterianas secundarias. Aves: ERC y otras respiratorias, salmonelosis, colibacilosis, cólera, enteritis necrótica, estafilo/estreptococosis, coriza, onfalitis e infección del saco vitelino, saculitis, sinusitis, sinovitis, dermatitis. Cerdos: Neumonía enzoótica y otras respiratorias, disentería, rinitis atrófica, enfermedad del edema, colibacilosis, salmonelosis, diarreas, corinebacteriosis, erisipelosis, leptospirosis, dermatitis, otras. Prerumiantes: infecciones respiratorias, entéricas y diarreas, enterotoxemia.

Dosis y Administración

Por 3 a 5 días: Aves: Preventivo: 1 kg/2000 L de agua (o en 1000 kg de alimento). Preventivo de micoplasmosis y terapéutico: 1 kg/1000 L de agua (o en 500 kg de alimento). Cerdos: Preventivo: 1 kg/4000 L de agua (o en 2000kg de alimento). Terapéutico: 1 kg/2000 - 4000 L de agua (o en 1000 - 2000 kg de alimento). Prerumiantes: Terapéutico: 2 veces/día a razón de 1 g/20 kg/vez (en agua, leche o alimento). Preventivo: Mitad de dosis.

Presentación Comercial

Sobre x 100 g, Sobre x 500 g, Sobre x 1 kg, Sobre x 15 g,

Registro Senasa

Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso. —
SENASA Perú: F.82.70.N.0023