

## TYLODOX® WS

### Polvo Soluble

Potente Combinación Antibiótica Bacteriostática  
- Aditiva de Amplio Espectro



### Formulación

Cada 100 g contiene: Tilosina como tartrato 10 g, Doxiciclina como hiclato 10 g, excipientes c.s.p. 100 g.

### Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la tilosina y/o doxiciclina. Entre ellas: infecciones del aparato respiratorio, digestivo y urogenital tales como: micoplasmosis, ERC, coriza, colibacilosis, onfalitis e infección del saco vitelino, cólera aviar, enteritis y diarrea, enteritis necrótica, saculitis, sinusitis, sinovitis, estafilococosis, estreptococosis, corinebacteriosis, hexamitiasis, leptospirosis entre otras. Prevención de infecciones bacterianas secundarias consecutivas a infecciones virales, condiciones de estrés, vacunaciones, realojamiento, corte de pico, transporte, cambios de alimentación y clima.

### Dosis y Administración

Aves y cerdos: Preventivo: 1 kg/2000 L de agua (o en 1000 kg de alimento) durante 3 - 5 días. Tratamiento: 1 kg/1000 - 1500 L agua (o en 500 - 750 kg de alimento) durante 3 - 5 días. Prerumiantes: Terapéutico: 2 veces/día a razón de 1 g/20 kg/vez por 3 - 5 días (en agua, leche o alimento). Preventivo: Mitad de dosis.

### Presentación Comercial

Sobre x 100 g, Sobre x 500 g, Sobre x 1 kg, Sobre x 15 g,

### Registro Senasa

SENASA Perú: F.03.70.I.1695



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.