

VENTOCARDYL® | CARDIOPULMIN

Solución Inyectable

Analéptico Cardiorespiratorio



Formulación

Heptaminol clorhidrato 100 mg, Diprofilina (difilina) 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Para casos de mal de altura, reanimación de recién nacidos, para revertir los efectos de neurolépticos y otros anestésicos, tos cardíaca, colapso, falla cardíaca, isquemia miocárdica, deficiencia circulatoria, hipotensión, miocarditis, insuficiencia venosa, astenia, cansancio y como desfatigante no específico. Como broncodilatador, indicado en casos de enfermedad obstructiva de las vías aéreas (cuando es reversible). Tratamiento concomitante en desórdenes del tracto respiratorio, disnea (asociada a la congestión y el edema de pulmón, como terapia adicional), edema pulmonar.

Dosis y Administración

1 mL/10 kg de p.v., de ser necesario, puede repetirse cada 4-5 horas, hasta por 4-5 días. Aplicar vía intravenosa, intramuscular o intraperitoneal.

Presentación Comercial

Frasco x 50 mL, Frasco x 100 mL,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.11.01.N.0008



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.