


## ANTIPIROZENE B12®

### Gránulos para Inyección

Hemoparasiticida, antianémico y antipirético.



### Formulación

Diminazene aceturato 1.05 g, Vitamina B12 3 mg, Antipirina c.s.p. 2.36 g.

### Indicaciones

Profilaxis y tratamiento de la babesia/piroplasmosis, tripanosomiasis y cystauzoonosis. La Vitamina B12 ayuda en la prevención de agranulocitosis y leucopenia. La antipirina asegura la solubilidad y actúa como ayuda contra la inflamación y la fiebre.

### Dosis y Administración

En general 3.5 mg/kg p.v. Para obtener dicha concentración, disolver el contenido total (2.36 g) en 15 mL de agua estéril. Inyectar 1 mL/20 kg de p.v. (solución ya reconstituida). En caninos, añadir 25 mL de agua estéril a cada sachet de 2.36 g; inyectar 1 mL/10 kg (solución ya reconstituida). Intervalos cada 24 horas o a criterio del Médico Veterinario. Caninos: Babesia: repetir a las 25 horas; tripanosomiasis: repetir cada dos semanas hasta la remisión clínica reportada por el laboratorio. Bovinos, ovinos, caprinos y equinos: Una sola vez y no exceder los 4 g totales por animal. Si se requiere repetir la dosis se realiza a criterio del médico veterinario a las 24 horas. Equinos: Dividir la dosis total y aplicarla intervalos de 1 a 2 horas. Aplicar vía intramuscular.

### Presentación Comercial

Sobre x 2.36 g, Sobre x 23.6 g,

### Registro Senasa

SENASA Perú:F.08.01.I.0874



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.