

CEFQUINOX® DC

Suspensión Intramamaria

Cefalosporina de Cuarta Generación Contra Todas las Bacterias Relevantes Causantes de Mastitis Bovina



Formulación

Cada jeringa de 3 g contiene: Cefquinoma (como sulfato) 150 mg, Excipientes c.s.p. 3 g.

Indicaciones

Para el tratamiento de la mastitis subclínica al secado y la prevención de nuevas infecciones bacterianas de la ubre durante el período de secado en las vacas lecheras causadas por los siguientes organismos sensibles a la cefquinoma: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, estafilococos coagulasa negativos.

Dosis y Administración

Cefquinox® DC se administra por vía intramamaria. Una jeringa por cada cuarto inmediatamente después del último ordeño. Ordeñar los cuartos completamente. Después de limpiar y desinfectar a fondo el pezón y su esfínter, infunda suavemente el contenido de una jeringa en el canal del pezón de cada cuarto. Dispersar el producto mediante suaves masajes en el pezón y ubre del animal afectado. Se debe tener cuidado para evitar la contaminación de la boquilla del inyector.

Presentación Comercial

Contenedor x 48 jeringas x 3 g,

Registro Senasa

Reg. SENASA Perú: F.082.085.I.00985.



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.