

## COMBIÓTICO L.A. SPI

### Polvo Soluble

Combinación antibiótica sinérgica de amplio espectro y larga acción



### Formulación

Combiótico® L.A. SPI 3.6 g Frasco 1: Penicilina G Benzatinica 2 000 000 U.I., dihidroestreptomicina sulfato equivalente a base 2 g. Frasco 2: Diluyente estéril 8 mL. Cada mL reconstituído contiene: Penicilina G Benzatinica 200 000 U.I, dihidroestreptomicina sulfato equivalente a base 0.2 g, excipientes c.s.p.1 mL. Combiótico® L.A. SPI 13.5 g Frasco 1: Penicilina G Benzatinica 7 500 000 U.I., dihidroestreptomicina sulfato equivalente a base 7.5 g. Frasco 2: Diluyente estéril 30 mL. Cada mL reconstituído contiene: Penicilina G Benzatinica 200 000 U.I, dihidroestreptomicina sulfato equivalente a base 0.2 g, excipientes c.s.p.1 mL.

### Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones locales o sistémicas causadas por gérmenes susceptibles a la penicilina y/o dihidroestreptomicina, siempre que se requiera un efecto de larga acción (dosis espaciadas)

### Dosis y Administración

Vía inyectable intramuscular (en caninos intramuscular y subcutánea), repetir a las 72 horas de ser necesario. Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, camélidos sudamericanos y cerdos: 1 mL/10 -20 kg de peso vivo. En animales jóvenes, la dosis es de 1 - 2 mL/ 25 kg de peso. Caninos y felinos: 1 - 2 mL/ 25 kg de peso vivo.

### Presentación Comercial

Frasco de 3.6g, Frasco de 8mL de diluyente, Frasco de 30mL de diluyente, Frasco de 13.5g,

### Registro Senasa



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.