

## VEQUINAX WS

### Polvo Soluble

Suplemento Nutracéutico con Acción  
Inmunoestimulante



### Formulación

Extracto de Echinacea purpurea (eq. a ácido chicórico 0.4 g) 25 g, excipientes c.s.p. 100 g.

### Indicaciones

Estimula el sistema de defensa inmunológico en todas las especies y está indicado como tratamiento complementario en caso de infecciones de cualquier índole, fiebre, retrasos de crecimiento y otras afecciones. Su acción inmunoestimulante se da mejorando la inmunidad celular y humoral, estimulando la secreción de interferón y mejorando de la capacidad de las células blancas. Como resultado de su aplicación, se obtiene un mayor título de anticuerpos, lográndose mejoras en la inmunidad posvacunal. Adicionalmente, inhibe la replicación viral y puede prevenir el brote de enfermedades. Ayuda en la prevención de brotes de peste porcina, gripe porcina, PRRS (Síndrome reproductivo y respiratorio porcino), y PCV (circovirus porcino). Como una ayuda en la prevención y tratamiento de enfermedades virales aviares como IBD, Newcastle, influenza, etc.

### Dosis y Administración

Aves y cerdos: en general: 50 - 100 g/200 L de agua o 50 - 100 g/100 kg de alimento. Aves: Para la terapia adyuvante de la enfermedad viral: 100 g en 150 L de agua o 100 kg de alimento total por 5 – 7 días; pollos broiler/patos/pavos: 100 g en 200 litros de agua después de la vacunación o usar entre el día 1 – 3 de edad y a partir de ahí, cada 10 días por 3 días; ponedoras: usar 3 días cada mes o después de la vacunación, 100 g en 200 L de agua. Porcinos: lechones: mezclar 100 g con 100 kg del alimento, usarlo por dos semanas; marranas: 100 g en 150 kg de alimento o 300 L de agua, usar 7 días antes de la monta, 7 días después del parto, 7 días después del destete por 3 – 5 días; cerdos entre la semana 13 y 17 de edad: 100 g en 150 kg de alimento o 300 L de agua, por 3 - 5 días. Otros animales: equinos, bovinos adultos: 1 - 2 g/50 kg p.v.; equinos y bovinos jóvenes, ovinos, caprinos, alpacas: 1 - 2 g/animal; perros y gatos: 1 g/10 kg p.v.; cuyes, conejos y aves de jaula: 0.3 - 0.5 g/animal.



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

### Presentación Comercial