

4 Acciones

Cero Descarte
de Leche

- ✓ Antibiótico
- ✓ Analgésico
- ✓ Antipirético
- ✓ Antiinflamatorio


Antibiótico en asociación
con Antiinflamatorio
no esteroideo



Ceftiofur HCl 5%
Ketoprofeno 15%

Ceftiofen®

La combinación perfecta
para la ganadería lechera



Nuevo

Ceftiofen®

Suspensión Inyectable

Ceftiofur HCl
5%



Ketoprofeno
15%



La combinación perfecta
para la ganadería lechera

Agrovet
MARKET



Av. Canadá 3792, San Luis, 15021, Lima - Perú
ventas@agrovvetmarket.com
☎ (+51) 1 2300 300 | 998 162 160 | (+51) 981 376 512
agrovvetmarket.com



PRESENTAMOS EL PRIMER CEFTIOFUR EN COMBINACIÓN CON KETOPROFENO DEL MERCADO

Ceftiofen® es una combinación de ceftiofur (como clorhidrato), antibiótico cefalosporínico de tercera generación y amplio espectro de acción, con un antiinflamatorio no esteroideo (no abortivo), el ketoprofeno, el cual además tiene propiedades analgésicas y antipiréticas.

Ceftiofen® brinda un tratamiento integral de forma eficaz contra los procesos infecciosos asociados a dolor e inflamación.

Múltiples Beneficios

- ✓ Reduce los síntomas asociados a la enfermedad gracias a su acción antiinflamatoria.
- ✓ Sin periodo de retiro en leche.
- ✓ Reduce los costos por tratamiento y mejora la rentabilidad.
- ✓ Menos estrés y manejo para los animales.
- ✓ Menos costos por mano de obra.




Rápida
Recuperación




Sin periodo
de retiro en leche

4 Acciones Cero Descarte de Leche

Ceftiofur HCl



Ketoprofeno



Ceftiofen®

La combinación perfecta
para la ganadería lechera



Suspensión
Inyectable

Bovinos

Ceftiofen® se encuentra indicado en casos de:

- Mastitis infecciosa aguda
- Pasteurellosis
- Neumonía
- Infección por *Haemophilus somnus*
- Metritis
- Pododermatitis en bovinos

También es apropiado para casos de laminitis aguda y crónica, distocia y uso posquirúrgico inmediato (descorne en terneros, cesáreas, entre otros).

Vía I.M., 1 mL/ 50 kg de peso cada 24 horas por 3 a 5 días.

Porcinos

Indicado para casos de:

- Bronquitis
- Neumonía
- Pleuroneumonía
- Salmonelosis
- Colibacilosis
- Pasteurellosis
- Síndrome Mastitis- Metritis- Agalactia

Vía I.M., 1 mL/ 17 kg de peso cada 24 horas por 3 días.

Rumiantes Menores

Tratamiento de infecciones respiratorias (neumonías) y otros procesos infecciosos causados por microorganismos sensibles al ceftiofur y que cursen con reacción inflamatoria.

Vía I.M., 1 mL/ 50 kg de peso cada 24 horas por 3 a 5 días.