

Coxuril T[®] 50 OS

Toltrazuril 5%

NUEVO



**Menos coccidias,
mejor desarrollo**

Solución oral



Frasco: 100 mL, 250 mL y 1 L

Diseña un plan para una buena salud intestinal



Booster® RN

1 jeringa en terneros recién nacidos



Coxuril T® 50 OS

3 mL / 10 Kg dosis única



Vetonic® con Nucleótidos

3 mL - 5 mL / animal

Coxuril T® 50 OS es un coccidicida de amplio espectro, que actúa contra las principales especies de coccidias, lo mismo que diversas especies de protozoarios. Efectivo para la prevención, tratamiento y control de la coccidiosis bovina.

Indicaciones de uso

Terneros



- *E. zuernii*
- *E. bovis*
- *E. ellipsoidalis.*

Caprinos



- *E. ninakohlyakimove*
- *E. alijevi*
- *E. arloingi*
- *E. christenseni*

Ovinos



- *E. faurei*
- *E. intricata*
- *E. ovinoidalis*
- *E. crandallis*
- *E. granulosa.*

Periodo de retiro

70 días

Principales características

- Elimina las coccidias en todos los estadios de desarrollo intracelular: esquizontes, macrogametocitos y microgametocitos, antes que causen daño en la mucosa intestinal.
- Su alta liposolubilidad le permite una amplia absorción en el intestino delgado y distribución en el organismo animal.
- Reduce significativamente la excreción de ooquistes, así como la prevalencia, duración y severidad de los brotes de coccidiosis.

Rendimiento de 1 frasco de 100 mL

Peso del ternero	40 Kg	60 Kg	115 Kg	150 Kg	250 Kg
Dosis	12 mL	18 mL	34.5 mL	45 mL	75 mL
N° de terneros tratados	8	5	2	2	1

Elimina la coccidiosis y optimiza su desempeño.

Dosis y administración

Coxuril T® 50 OS debe ser administrado directamente en la boca del animal.

Especie	Dosis Única
Terneros	15 mg/Kg (3 mL /10 Kg) En terneros hasta 9 meses de edad
Ovinos y caprinos	20 mg/Kg (1 mL /2.5 Kg) Tratarse antes que aparezcan signos clínicos.



NUEVO

Coxuril T[®] 50 OS

Toltrazuril 5%

Altamente efectivo contra todas las especies de coccidias



Alta liposolubilidad para una amplia absorción



Compatible con otros medicamentos y aditivos



Alto margen de seguridad



Solución oral



Frasco: 100 mL, 250 mL y 1 L

Diseña un plan para un buen desarrollo



Coxuril T® 50 OS
1 mL / 2.5 kg

Coccidicida



Iron-Dex 200® B12
1 mL / dosis única

Hierro



ProBiolYTE® WS
0.5 - 0.75 g/L de agua
0.20 - 0.25 g/Kg de alimento

Probióticos

Coxuril T® 50 OS es un coccidicida de amplio espectro, que actúa contra las principales especies de coccidias, lo mismo que diversas especies de protozoarios. Efectivo para la prevención, tratamiento y control de la coccidiosis porcina.



Indicaciones de uso

Porcinos



- *Isospora suis*.
- *Eimeria* spp.
- *Cryptosporidium* spp.

Periodo de retiro

70 días

Principales características

- Elimina las coccidias en todos los estadios de desarrollo intracelular: esquizontes, macrogametocitos y microgametocitos, antes que causen daño en la mucosa intestinal.
- Su alta liposolubilidad le permite una amplia absorción en el intestino delgado y distribución en el organismo animal.
- Reduce significativamente la excreción de ooquistes, así como la prevalencia, duración y severidad de los brotes de coccidiosis.

Rendimiento de 1 frasco de 100 mL

Peso del lechón	1 Kg	1.25 Kg	1.5 Kg	1.75 Kg	2 Kg
Dosis	0.4 mL	0.5 mL	0.6 mL	0.7 mL	0.8 mL
Nº de lechones tratados	250	200	167	143	125

Elimina la coccidiosis y optimiza su desempeño.

Dosis y administración

Coxuril T® 50 OS debe ser administrado directamente en la boca del animal.

Dosis Única

20 mg/Kg (1 mL /2.5 Kg) | Entre el 3er y 5to día de edad



NUEVO

Coxuril T[®] 50 OS

Toltrazuril 5%



Altamente efectivo contra todas las especies de coccidias




Alta liposolubilidad para una amplia absorción



Compatible con otros medicamentos y aditivos



Alto margen de seguridad



Solución oral

Frasco: 1 L

Diseña un plan para una buena salud intestinal



Coxuril T® 50 OS

1 mL / 2 L de agua



ProBiolyte® WS

0.5 - 0.75 g/L de agua
0.20 - 0.25 g/ Kg de alimento

Coxuril T® 50 OS es un coccidicida de amplio espectro, que incluye las principales especies de coccidias, lo mismo que diversas especies de protozoarios. Efectivo para la prevención, tratamiento y control de la coccidiosis aviar.

Indicaciones de uso

Aves



► Pollos de engorde pollitas y pollonas:

- *Eimeria acervulina*
- *E. maxima*
- *E. necatrix*
- *E. mivati*
- *E. brunetti*
- *E. mitis*
- *E. embati*
- *E. tenella*

► Pavos:

- *E. adenoides*
- *E. meleagrimitis*

► Gansos:

- *E. anseris*
- *E. truncata*

► Palomas:

- *E. columbarum*
- *E. labbeans*

Periodo de retiro

14 días

Principales características

- Elimina las coccidias en todos los estadios de desarrollo intracelular: esquizontes, macrogametocitos y microgametocitos, antes que causen daño en la mucosa intestinal.
- Ha demostrado una excelente acción contra la coccidiosis subclínica, en el tratamiento de brotes postvacunales y en la generación de inmunidad.
- No interfiere con la absorción de nutrientes, consumo de agua ni de alimento, por lo que no altera la ganancia de peso y la conversión alimenticia.



Dosis y administración

Coxuril T® 50 OS debe ser administrado en el agua de bebida.

Aves*		
Uso	Dosis	Duración del tratamiento
Tratamiento	7 mg/Kg (1 L de producto/ 2000 L agua de bebida)	2 días consecutivos

*No utilizar en aves ponedoras en producción.

