

Fipronex®

Solución Externa

Ectoparasitocida de Larga Acción

agrovvetmarket s.a

FORMULACIÓN

Fipronil	0,25 g
Excipientes c.s.p	100 mL

INDICACIONES

Fipronex® proporciona un control efectivo de pulgas y garrapatas en perros y gatos adultos y en cachorros y gatitos desde la primera semana de edad. Posee acción adicional contra piojos y sarna sarcóptica (var. *canis*).

CARACTERÍSTICAS

Fipronex® es un insecticida de acción rápida y prolongada. Controla rápidamente la infestación de pulgas matando las pulgas adultas antes de que éstas pongan huevos. Previene la reinfestación y elimina rápidamente el estrés en mascotas, resultante de las molestias causadas por las pulgas y garrapatas, por la pérdida de sangre, picazón y por reacciones alérgicas a las picaduras de las pulgas. El efecto residual de Fipronex® previene la reinfestación matando las pulgas y garrapatas por un periodo de por lo menos 60 días. Los estudios han mostrado que Fipronex® puede proteger perros adultos contra pulgas por más de 90 días.

MECANISMO DE ACCIÓN

El fipronil, principio activo de Fipronex®, actúa desestabilizando las funciones nerviosas normales de las pulgas y garrapatas. Bloquea los canales dlorhídricos de la barrera GABA (ácido gamma aminobutírico) de las neuronas en el sistema nervioso central. El sistema receptivo GABA es el responsable de inhibir la actividad neuronal normal (por ejemplo: previene la estimulación excesiva de los nervios). Cuando las funciones regulares del sistema son bloqueadas por el fipronil, causa excitación neural y la muerte del insecto. El fipronil mata al insecto por contacto o ingesta. El curso principal de la actividad depende del insecto objetivo. Es efectivo en estadios adultos y larvarios.

DIRECCIONES PARA SU USO

Para prevenir cualquier daño a usted y/o a sus mascotas, se recomienda leer toda la etiqueta, caja y/o las indicaciones adjuntas previamente a cada uso. Siga detenidamente todas las indicaciones y direcciones. Utilícelo sólo en perros y gatos. No utilice en otros animales.

Para matar pulgas y garrapatas en todos sus estadios, aplicar a perros, gatos, cachorros y gatitos como se indica:

- Emplee guantes de látex de uso doméstico y de ser posible anteojos protectores.
- Sostenga la botella en posición vertical. Levante el pelo del animal con una mano mientras aplica el spray en la espalda del animal, a los lados, vientre, piernas, hombros y cuello. Para el área de la cabeza y de los ojos, aplique Fipronex® en la mano con guantes y frote suavemente en el pelo del animal. Mantenga alejado de los ojos y boca de su mascota.
- Aplique el spray hasta que el pelo del animal esté húmedo o completamente mojado. Se requiere aproximadamente 3 a 6 mL por cada kg de peso vivo. Un frasco de 55 mL puede ser usado en un animal de menos de 18 kg, de peso, un frasco de 110 mL puede ser usado en un animal de menos de 36 kg, de peso y un frasco de 275 mL puede ser usado en un animal de menos de 91 kg, de peso aproximadamente. El frasco de 550 mL deberá ser usado como refill (recarga) para cualquiera de los frascos mencionados (no viene acompañado de spray dosificador). Como con cualquier producto insecticida, después del uso deberán lavar a fondo con abundante agua y jabón, tanto las manos como la piel expuestas al producto.

Para prevenir el aumento o la reinfestación por pulgas, emplear Fipronex® antes del inicio de temporadas calurosas y después mensualmente o de acuerdo a criterio del veterinario. No se recomienda aplicaciones con menos de 30 días de intervalo.

Para el control de garrapatas se debe humedecer al animal por completo, sobre todo en las patas, cabeza y cuello. Se puede dirigir el spray directamente a la garrapata aunque no es estrictamente necesario.

No se recomienda bañar ni mojar al animal 4 días antes ni 4 días después del tratamiento, pues el tiempo de acción de Fipronex® se ve afectado por la exposición o baños con champú.

DIRECCIONES PREVENTIVAS

Humanos: Fipronex® es muy seguro cuando se usa de acuerdo a las instrucciones. Sin embargo, es dañino si se traga o se absorbe por la piel. Puede causar irritación severa en los ojos. Evite respirar el spray. Evite el contacto con la piel, cara, ojos o ropa. Después de su aplicación, lavarse a fondo las manos y piel expuesta con abundante jabón y agua. Las personas que aplican este producto deben usar guantes de látex de uso doméstico y si es posible anteojos protectores.

Animales: Sólo para uso externo. Estudios realizados con Fipronex® demostraron que es muy seguro cuando se usa de acuerdo a las instrucciones. Sin embargo, puede causar irritación severa en los ojos. Tenga cuidado de no rociar sobre los ojos ni cara del animal. Si se usa en cachorros o gatitos menores de 2 meses, hacerlo con extremo cuidado, vigilándolos hasta que estén completamente secos. Puede ocurrir sensibilidad individual después de emplear cualquier pesticida para mascotas, aunque son raras. Si los signos persisten o llegan a ser más severos, consultar a un veterinario inmediatamente. Ciertas medicinas pueden interactuar con pesticidas. Consulte a un veterinario antes de utilizar este producto en animales medicados o junto con otros pesticidas. Este producto puede ser perjudicial para animales débiles, viejos o bajo cuidado. No usar en otras especies.

Propiedades fisico-químicas: Inflamable. Aléjelo del calor y llamas.

Primeros Auxilios:

- Por ingestión: llamar a un médico de inmediato. Beba 1 ó 2 vasos de agua e induzca el vómito tocando la parte posterior de la garganta con el dedo, si la persona esta inconsciente, no darle nada por la boca ni inducir el vómito.
- Por inhalación: lleve la víctima al aire libre. Si no respira, dar respiración artificial, preferiblemente boca a boca, llamar a un médico de inmediato.
- Por contacto en los ojos: Lavar los ojos con abundante agua. Consulte a un médico si la irritación persiste.
- Por contacto en la piel: Lávese inmediatamente con abundante jabón y agua. Consulte a un médico si la irritación persiste.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DEL ENVASE

Al almacenarse, no contamina el agua, ni el alimento. Almacenar el producto nuevo en su frasco original únicamente, fuera del alcance de niños y animales domésticos; entre 15°C y 30 ° C. No reutilizar el envase ni incinerarlo. Envolver el frasco vacío en varias capas de papel y desechar en la basura.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Caja individual conteniendo frascos PET por 55, 110 mL y 275 mL acompañados de bomba dosificadora y frascos PET por 550 mL.

La empresa responsable y el vendedor no dan garantía expresa o implícita, con respecto al uso de este producto de una manera diferente a la indicada en la etiqueta, caja y/o prospecto. El comprador asume todo riesgo del uso y el manejo de este producto cuando tal uso y manejo sean opuestos a los indicados en las instrucciones.

Reg. SENASA Perú: F.07.08.N.0209; Colombia: Reg. ICA N° 7415-MV;
Costa Rica: Reg. MAG PE10-43-06-3083 ;
Reg. Ecuador: 3B1-2-8423-AGROCALIDAD; Reg. Guatemala:
PE200-43-02-4724; Reg. Nicaragua: 10202; Reg. Panamá: RF-2830-14;
Reg. Rep. Dominicana: 5447; Reg. Sri Lanka: 185.4.3;
Reg. Tailandia: 166/2552; Reg. Vietnam: PCP-4-of 440/QLT-NK-12

Fipronex® es una marca registrada de



agrovvetmarket

animal health

Av. Canadá 3792-3798, San Luis. Lima 30 - Perú

Tel.: (511) 2 300 300

Email: ventas@agrovvetmarket.com - Web: www.agrovvetmarket.com

Fabricado por Farmex S.A.

Calle Dean Valdivia 148 dpto. 07 San Isidro. Lima - Perú.

AGROVET/STH

VZ/18/018

Fipronex®

External Solution

Long-acting ectoparasiticide

agrovvetmarket s.a.

FORMULATION

Fipronil 0.25 g
Excipientsq.s.ad..... 100 mL

INDICATIONS

Fipronex® provides an effective control of fleas and ticks in adult dogs and cats; and in puppies and kittens from the first week of age. It has additional action against lice and scabies (var. *canis*).

CHARACTERISTICS

Fipronex® is an insecticide of fast and prolonged action. It controls flea's infestation quickly, killing the adult ones before they puts eggs. It prevents the reinfestation and it quickly eliminates stress in pets, resulting of the discomfort caused by fleas and ticks, the loss of blood, the itching and the allergic reactions to the fleas bite. The residual effect of **Fipronex®** prevents reinfestation by killing fleas and ticks for up to 60 days period. The studies have shown that **Fipronex®** can protect adult dogs against fleas for more than 90 days.

MECHANISM OF ACTION

Fipronil, active ingredient of **Fipronex®**, acts destabilizing the normal nervous functions of fleas and ticks. It blocks the chlorine channels of the GABA barrier (gamma amino butyric acid) of neurons in the central nervous system. GABA receptive system is responsible for the inhibiting the normal neuronal activity (e.g. it prevents the excessive stimulation of nerves). When the system's regular functions are blocked by fipronil, it causes neuronal excitation and the insect's death. Fipronil kills the insect by contact or ingestion. The main activity course depends on the target insect. It is highly specific against adults and larval stages.

DIRECTIONS FOR USE

To prevent any damage to you or your pet, it is recommended to read the whole label, box and this leaflet before its use. Follow completely all the indications and directions. Use it only in dogs and cats. Do not use it in other animals.

To kill fleas and ticks in all their stages, apply to dogs, cats, puppies and kittens as indicated:

- Use rubber or latex domestic gloves and eye protection when possible.
- Hold the bottle in vertical position. Lift the animal's hair with one hand while applying the spray in the back of the animal, the sides, belly, legs, shoulders and neck. For the head and eyes area, apply **Fipronex®** in your hand with gloves on and rub gently in the animal's hair. Keep it away from your pet's eyes and mouth.
- Apply the spray until the hair is damp or completely wet. Approximately 3 - 6 mL per kg body weight are required. A 55 mL bottle can be used in an animal less than 18 kg bw, a 110 mL bottle can be used in an animal less than 36 kg bw and a 275 mL bottle can be used in an animal less than 91 kg bw. The 550 mL bottle must be used as a refill for any of the other presentations (it does not come with a nozzle). Like with any other insecticide, wash your hands and exposed skin after use, with plenty of soap and water.

To prevent flea buildup or reinfestation, use **Fipronex®** bprior to the onset of warm seasons and monthly thereafter or according the veterinarian's advice. Applications with less than 30-day intervals are not recommended.

For tick control the animal must be dampen completely, mainly in the legs, head and neck. Spray can be oriented directly to the tick although it is not strictly necessary.

Bathing or wet the animal 4 days before or 4 days after the application is not recommended, as the exposure to rain or shampoo baths will decrease the duration of activity of **Fipronex®**.

PREVENTIVE DIRECTIONS

Humans: **Fipronex®** is very safe when used according to the instructions. Nevertheless, it is harmful if swallowed or absorbed through the skin. May cause severe eye irritation. Avoid breathing spray. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash hands thoroughly with soap and water after handling. Persons applying this product must wear household latex gloves and if possible, protective eyewear.

Animals: For external use only. Studies made with **Fipronex®** demonstrated that it is very safe when used according to the instructions. Nevertheless, may cause severe eye irritation. Take care not to spray in the animal's eyes or facial area. If used in puppies or kittens under 2 months-old, do it with extreme care, watching them until they are completely dry. Individual sensitivities, while rare, may occur after using any pesticide product for pets. If signs persist, or become more severe, consult a veterinarian immediately. Certain medications can interact with pesticides. Consult a veterinarian before using this product on medicated animals and before using this product with other pesticides. This product can be detrimental for weak or old animals. Consult a veterinarian before using. Not to be used in other species.

Physical-chemical hazards: Flammable. Keep away from heat and open flame.

First aid:

- If swallowed: Call a doctor immediately. Drink 1 or 2 glasses of water and induce vomit by touching the rear part of the throat with the finger. If the person is unconscious, do not give anything by mouth and do not induce vomit.
- If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. Call a doctor for further treatment advice.
- Eye contact: Hold eye open and rinse slowly and gently with water. Seek medical attention if irritation persists.
- Skin contact: Rinse skin immediately with plenty of water and soap. Seek medical attention if irritation persists.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal. Store the product in original container only, out of reach of children and domestic animals, between 15° and 30° C. Do not reuse this container. Do not incinerate. Wrap the empty bottle in several layers of paper and discard.

COMMERCIAL PRESENTATION

Individual box containing PET bottles of: 55 mL, 110 mL and 275 mL with spray pump.

The responsible company and the seller makes no warranty, expressed or implied, concerning the use of this product other than indicated on the label, box and/or leaflet. Buyer assumes all risk of use and handling of this material when such use and handling are contrary to pointed above instructions.

Reg. SENASA Peru: F.07.08.N.0209; Colombia: Reg. ICA N° 7415-MV;
Costa Rica: Reg. MAG PE10-43-06-3083;
Reg. Ecuador N°: 3B1-2-8423-AGROCALIDAD;
Reg. El Salvador: 2004-07-3066;Reg. Guatemala: PE200-43-02-4724;
Reg Nicaragua: 10202; Reg. Panama: RF-2830-14; Reg. Dominican Rep.: 5447;
Reg. Sri Lanka: 185.4.3; Reg. Thailand: 166/2552;
Reg. Vietnam: PCP-4-of 440/QLT-NK-12

Fipronex® is a registered trademark of



agrovvetmarket
animal health

Av. Canada 3792-3798, San Luis, Lima 30 - Peru
Tel: (511) 2 300 300

Email: ventas@agrovvetmarket.com - Web: www.agrovvetmarket.com

4/2020/016/116/69

V09.12/15