

SHAKE BEFORE USE
Nutritional supplement for veterinary use,
is not veterinary medicine

M.V. Resp. Emp. Titular: Umberto Calderon O. CMVP 2944.
Reg. SENASA Perú: A.16.19.N.0142; Bolivia: SENASAG Reg.
PUV- F N° 006597/15; Colombia: Reg. ICA N° 14331 SL;
Reg. Costa Rica: LIC. DAA-MAG 802-017;
Reg. Emiratos Árabes Unidos: DXB-APH-10-1712320;
Reg. Ecuador: 1A-1B-14597-AGROCALIDAD;
Reg. El Salvador: AL2016052975; Reg. Guatemala:
PE354-07-07-967; Honduras: PF-83T; Reg. Nicaragua:
9951; Reg. Panamá: RF-7197-14.

Hematofos B12® is a registered trademark of **Agrovet Market S.A.**
Avivet® It is a division of **Agrovet Market Animal Health.**

Avivet®

Av. Canadá 3792-3798, San Luis, Lima 15021 - Perú
(511) 2 300 300
ventas@agrovetmarket.com
agrovetmarket.com

04227980001 10/2020

Agrovet
MARKET

Hematofos B12® AC OS

Solución Oral - Uso Veterinario
Multi-Reconstituyente adicionado con Fósforo

Avivet®

FÓRMULA

DL-Metionina	10 000 mg
L-Histidina	5000 mg
L-Triptófano	2500 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)	11 mg
Vitamina B2 (como riboflavina fosfato sódico)	2000 mg
Vitamina B3 (nicotinamida).....	5000 mg
Vitamina B6 (como piridoxina clorhidrato)	10 000 mg
Citrato de hierro amoniacal verde.....	20 000 mg
Cobalto (como acetato de cobalto tetrahidratado)	120 mg
Glicerofosfato sódico	10 000 mg
Excipientes c.s.p.	1 L

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Se administra solo o en el agua de bebida. Terneros y potros: 30 mL. Porcinos, ovinos y caprinos: 5 mL o 145 gotas/20 kg de peso vivo. Dosis diluida: Lechón (maternidad): 25 gotas/1L agua. Lechón (post-destete): 10 gotas/L agua. Desarrollo (<50 Kg): 20 gotas/1L agua. Engorde (>50 Kg): 25 gotas/1L agua. Cerda Gestante: 35 gotas/1L agua. Cerda Lactante: 20 gotas/1L agua. Aves: 70-145 gotas/1L de agua. Caninos y felinos: 2 a 5 mL/día (1 mL = 20 gotas), diluido en una proporción de 1mL/20 mL de agua. Conejos y cuyes: 1 a 2 mL/día.

INDICACIONES

En todas las especies animales como coadyuvante en casos de anemias, desnutrición, convalecencias de enfermedades infecciosas, parasitarias, diarreas prolongadas, ayudando además a combatir el decaimiento y la fatiga. En todos los trastornos de la hematopoyesis, anemias de origen alimenticio, infeccioso, parasitario o post-hemorrágico.

PRECAUCIONES

Una vez diluido en agua, usar sólo por 24 horas

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente entre 10°C y 30°C, en un lugar seco y bien ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños.

AGITAR ANTES DE USAR
Suplemento nutricional para uso veterinario,
no es medicamento veterinario.

M.V. Resp. Emp. Titular: Umberto Calderón O. CMVP 2944.
Reg. SENASA Perú: A.16.19.N.0142; Bolivia: SENASAG Reg.
PUV- F N° 006597/15; Colombia: Reg. ICA N° 14331 SL;
Reg. Costa Rica: LIC. DAA-MAG 802-017;
Reg. Emiratos Árabes Unidos: DXB-APH-10-1712320;
Reg. Ecuador: 1A-1B-14597-AGROCALIDAD;
Reg. El Salvador: AL2016052975; Reg. Guatemala:
PE354-07-07-967; Honduras: PF-83T; Reg. Nicaragua:
9951; Reg. Panamá: RF-7197-14.

Hematofos B12® es una marca registrada de **Agrovet Market S.A.**
Avivet® es una división de **Agrovet Market Animal Health.**

Importado y distribuido en: Ecuador por Grupo Grandes S.A.
Calle N74C y Calle E4. Quito.

Fabricado por: Pharmadix Corp. S.A.C. Av. Santa Lucía
Nro. 218 - Urb. Ind.La Aurora - Ate. Lima - Perú.
Para: Agrovet Market S.A.

VENTA LIBRE

Avivet®

Av. Canadá 3792-3798, San Luis. Lima 15021 - Perú
(511) 2 300 300
ventas@agrovetmarket.com
agrovetmarket.com

Agrovet
MARKET

Hematofos B12® AC OS

Oral Solution for Veterinary Use
Multi-Reconstituent complemented whit
Phosphorous

Avivet®

FORMULA

DL-Methionine	10 000 mg
L-Histidine	5000 mg
L-Tryptophan	2500 mg
Vitamin B12 (cyanocobalamin)	11 mg
Vitamin B2 (as riboflavin sodium phosphate)	2000 mg
Vitamin B3 (nicotinamide).....	50 000 mg
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride)	10 000 mg
Ferric ammonium citrate green.....	20 000 mg
Cobalt (as cobalt acetate tetrahydrate)	120 mg
Sodium glycerophosphate	10 000 mg
Excipients q.s.ad.	1 L

DOSAGE AND ADMINISTRATION

It is administered alone or in the drinking water. Calves and foals: 30 mL. Pigs, sheep and goats: 5 mL or 145 drops/20 kg b.w. Diluted doses: Sucking pig (Maternity): 25 drops/1L water. Sucking pig (post-weaning): 10 drops/L water. Growth (<50 kg): 20 drops/1L water. Fattening (> 50 kg): 25 drops/1L water. Gestating sow: 35 drops/1L water. Lactating sow: 20 drops/1L water. Poultry: 70-145 drops/1L of water. Dogs and cats: 2 to 5 mL/day (1 mL = 20 drops), diluted in a ratio of 1 mL/20 mL water. Rabbits and guinea pigs: 1 to 2 mL/day.

INDICATIONS

In all animal species as an adjunct in cases of anemia, malnutrition, convalescence of infectious, parasitic, prolonged diarrhea diseases, helps to combat decay and fatigue. In all hematopoietic disorders, anemias of nutritional origin, infectious, parasitic or post-hemorrhagic.

PRECAUTIONS

Once diluted in water, use only for 24 hours.

STORAGE CONDITIONS

Store at room temperature between 10°C and 30°C, in a dry and well ventilated place. Keep out of reach of children.