

DOXIMUTIN® WS

Polvo Soluble

Potente Combinación Antibiótica
Aditiva-Sinérgica Pleuromutilina-Tetraciclina



Formulación

Tiamulina fumarato 10 g, Doxiciclina (como clorhidrato) 15 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de enfermedades respiratorias, entéricas, mixtas y/o complicadas, infecciones secundarias y para mantener la ganancia de peso corporal. Aves: Enfermedad respiratoria crónica (CRD), saculitis aérea y sinusitis, enteritis necrótica, enteritis bacterianas, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar, neumonías, onfalitis, sinovitis, estrés o mortandad temprana. Cerdos: Micoplasmosis, neumonía micoplásmica (enzoótica), ileítis porcina, disentería porcina, colitis, rinitis atrófica, neumonías, pleuroneumonía, enfermedad de Glässer, sinovitis infecciosa, enteritis necrótica e infecciosa, salmonelosis, colibacilosis, abscesos cervicales y de las articulaciones.

Dosis y Administración

Aves: Preventivo: 1 kg/1,500 L de agua (o en 750 kg de alimento). Terapéutico: 1 kg/ 1,000 -1,500 L (o en 500-750 kg de alimento) por 3-5 días. Doblar la dosis en casos de enfermedad respiratoria crónica. Cerdos: Preventivo: 1 kg/3,000 L de agua (o en 1,500 kg de alimento). Terapéutico: 1 Kg/2,000 – 3,000 L de agua (o en 1,000-1,500 kg de alimento) por 3-7 días.

Presentación Comercial

Sobre x 100 g, Sobre x 1 kg, Sobre x 10 kg, Sobre x 15 g, Sobre x 20g,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.03.26.I.1881



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.