

LIQUAMOX® C

Polvo para Suspensión Oral

Antibiótico betalactámico de amplio espectro con inhibidor de resistencia bacteriana



Formulación

Amoxicilina (como amoxicilina trihidrato) 40 mg, Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio) 5.7 mg, excipientes c.s.p 1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento de infecciones causadas por cepas susceptibles (bacterias aerobias y anaerobias): infecciones periodontales, de la piel y tejido blando causadas por especies susceptibles de *Staphylococcus* spp. *E. coli*, *Pasteurella* spp. y *Streptococcus* spp. Adecuado en infecciones del tracto respiratorio y urinario, incluyendo aquellas causadas por especies susceptibles de *E. coli*. Tratamiento de osteomielitis y otras complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina.

Dosis y Administración

Preparación: agite el mismo para aflojar el polvo, añada agua hasta la marca del frasco y agite bien, ya reconstituído, cada mL contiene 40 mg de amoxicilina (como sal trihidratada) y 5.7 mg de ácido clavulánico (como sal potásica). Deje reposar durante 5 minutos para asegurar una dispersión completa. Caninos: 1 mL/2-3.5 kg cada 8-12 horas por 7-28 días. Gatos: 1 mL/2-3.5 kg cada 8-12 horas por 5-14 días. La suspensión reconstituída debe almacenarse en refrigeración (entre 2°C y 8°C) y puede utilizarse hasta por 7 días.

Presentación Comercial

Frasco x 11g,

Registro Senasa

SENASA Peru: F.82.32.I.0151



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.