

## VETOCAÍNA A2

### Solución Inyectable

Anestésico local



### Formulación

Lidocaína clorhidrato 20 mg, Adrenalina bitartrato 0.04 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

### Indicaciones

Como anestésico local por infiltración (epidural o paravertebral) en cesáreas, cortes de cola, castraciones, exámenes y diagnóstico de cojeras en equinos. Para anestesia conductiva, bloqueo nervioso (como de los nervios intercostales, mandibular y del plexo braquial) y subaracnoideo, infiltración intra-articular, para controlar el dolor clínico. Como anestesia local con fines diagnósticos y exploratorios. La potente acción vasoconstrictora de la adrenalina le otorga un efecto antihemorrágico al momento de cirugías, además prolongando el efecto anestésico de la lidocaína.

### Dosis y Administración

Bloqueo nervioso o de conducción: Inyecciones de diagnóstico en caballos y vacas: 5 - 10 mL, anestesia del nervio cornual de la vaca (descorne): 8 - 10 mL en cada lado. Anestesia de infiltración: En casos de administración repetida, el volumen total administrado no debe exceder 0.5 mL/ kg de p.v., gatos: 1 mL, perros: 1 - 2 mL, caballos: de 100 - 200 mL por sitio para cirugía. Anestesia sacral: Para cirugía en animales de pie: Caballos: 5 - 10 mL (administración lenta), vacas: 4 - 6 mL (administración lenta), ovejas, cabras, camélidos: 2 - 3 mL (administración lenta). Anestesia epidural: Para cirugía en animales recostados: Caballos: 25 - 75 mL (administración lenta), vacas: 15 - 60 mL (administración lenta), animales pequeños: 1.5 mL/10 cm de longitud de la columna vertebral (administración lenta).

### Presentación Comercial

Frasco x 100 mL,

### Registro Senasa

Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso. —  
SENASA Perú: F.59.01.N.0007