

USO VETERINARIO

Antiparasitario Interno de Amplio Espectro con Minerales

FBZ[®] 12.5%

con Minerales



Mejora
la condición
animal

Encuentranos en




FBZ® 12.5%

con Minerales



Zinc
Selenio
Cobalto



Adicionado con
3 minerales

Su exclusiva fórmula de fenbendazole adicionada con Cobalto, Zinc y Selenio favorece el tratamiento y control de los parásitos internos, incluyendo tenias.

Actúa como preventivo de anemias

El cobalto ayuda a prevenir anemias causadas por parásitos.

Mejora piel, pelaje y lana

La presencia del Zinc ayuda a recuperar el aspecto de tu animal mejorando la piel, el pelaje y la lana.

Favorece la reproducción

El Selenio es un factor importante que mejora el rendimiento en la reproducción.



FBZ® 12.5% con Minerales

Suspensión Oral - Uso Veterinario

FORMULACIÓN: Fenbendazole 12.5 g; Sulfato de Cobalto 1.6 g; Carbonato de Zinc 0.6 g; Selenito de Sodio 0.3 g; Excipientes c.s.p. 100 mL. **INDICACIONES:** FBZ® 12.5% con Minerales, es un antiparasitario de amplio espectro; para el control y tratamiento de las parasitosis internas de bovinos, equinos, ovinos y caprinos; incluyendo casos de teniasis. Incluye en su fórmula minerales con acción directa en la prevención de anemias (cobalto), en la mejora del pelaje, piel y lana (zinc) y mejora en la reproducción (selenio). Su acción incluye formas maduras e inmaduras (incluyendo estadios inhibidos y huevos) de: Gusanos del estómago: *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp. y *Trichostrongylus axei*. Intestinales: *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides* spp., *Ostertagia* spp. (incluidos sus estados hipobióticos), entre otros. Pulmonares: *Dictyocaulus* spp. Tenias: *Moniezia* spp. **DOSIFICACIÓN:** Via oral. **Bovinos de toda raza:** Nemátodos gastrointestinales y pulmonares: 1 mL/25 kg (5 mg/kg). Tenias: 1 mL/12.5 kg (10 mg/kg). Larvas *Ostertagia* tipo II (hipobióticas): 1 mL/16 kg de peso vivo (7.5 mg/kg). **Ovinos y caprinos:** Nemátodos gastrointestinales y pulmonares: 1 mL/25 kg (5 mg/kg). Tenias: 1 mL/12.5 kg (10 mg/kg). Larvas *Ostertagia* tipo II (hipobióticas): 1 mL/16 kg de peso vivo (7.5 mg/kg). **Equinos:** 1 mL/16 kg de peso vivo (7.5 mg/kg). **PERIODO DE RETIRO:** Carne: 14 días, Leche: 3 días. **CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y PRECAUCIONES:** No se han reportado contraindicaciones ni limitaciones de uso cuando el producto se administra en la dosis recomendada. El producto es muy bien tolerado. Es compatible con otros antihelmínticos. No administrar conjuntamente con los derivados bromados de la salicililánilid. No se recomienda su uso en animales debilitados, muy parasitados o en simultáneo con otras medicaciones, baños o vacunaciones. Agítase antes de usar. Mantener fuera del alcance de los niños y de animales domésticos. **ALMACENAMIENTO:** Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Almacenar entre 8° y 30° C. **PRESENTACIÓN COMERCIAL:** Frasco x 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 Litro y 3.9 Litros (1 galón). Jeringa dosifácil x 30 mL.

VI-170601

Productos Veterinarios de Clase Única



agrovetmarket
animalhealth