

1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial : Cyromix® 100 Px
- 1.2. Clase de uso : Antiparasitario
- 1.3. Formulación : Polvo Oral
- 1.4. Descripción : Larvicida Regulador de Crecimiento para Medicación Oral

2. COMPOSICION

Cada 100 g de Cyromix® 100 Px contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Ciromazina	10.00	g
Excipientes c.s.p	100	g

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: polvo.
- 3.2. Color: Blanco a blanquecino

4. DESCRIPCIÓN

Cyromix® 100 Px es una premezcla medicamentosa que contiene un regulador sintético de crecimiento de insectos que actúa inhibiendo la muda y la pupación.

5. INDICACIONES

Aditivo alimenticio para el control de larvas de las moscas (Mosca del establo: *Stomoxys calcitrans*, mosca del cuerno, *Haematobia irritans*, pequeña mosca doméstica *Fannia canicularis*, mosca del estiércol de los pollos *Fannia pusio*, mosca doméstica, *Musca domestica*, mosca de la fruta *Drosophila melanogaster*) y pulgas en aves (Pulga de la gallina *Echidnophaga gallinacea*, pulga del hombre *Pulex irritans*).

6. ESPECIES DE DESTINO

Aves.

Cyromix® 100 Px

7. ADMINISTRACIÓN

Oral en el alimento. Se adiciona en el alimento balanceado de gallinas en producción durante cuatro a seis semanas continuas, seguido de un periodo de descanso que puede durar de cuatro a seis semanas.

8. DOSIS

Dosis en aves:

50 g por tonelada de alimento por dos períodos de 4 a 6 Semanas, con un intervalo de 4 a 6 semanas sin tratamiento. Para reducir de inmediato la población de mosca, debe aplicarse **Cyromix® 100 Px** y un adulcicida (como **No-Fly**).

9. PRECAUCIONES

- Evite contaminar las fuentes de agua con los residuos del lavado o limpieza.
- Evitar al máximo la entrada de agua sobre la gallinaza y la cama para no diluir el producto.
- Evitar el contacto con la piel u ojos o su inhalación. En caso de producirse, lavar con abundante agua.
- No comer ni fumar durante la manipulación del producto o su aplicación.
- Usar ropas adecuadas, guantes, protección ocular y respiratoria.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

10. CONTRAINDICACIONES

- No agregar el producto directo al alimento; mezclar de manera gradual.

11. PERIODO DE RETIRO

Carne: 3 días

12. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz entre 15 y 30°C, alejado del alcance de los niños. Se recomienda utilizar todo el contenido una vez abierto y no almacenar bolsas abiertas.

13. PRESENTACIÓN

15 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg