

1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial: Optiflor 300
- 1.2. Clase de uso: Antibiótico.
- 1.3. Formulación: Solución inyectable.

2. COMPOSICION

Cada 100mL de Optiflor 300 contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Florfenicol	30	mg
Excipientes c.s.p.	100	mL

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: Solución libre de impurezas.
- 3.2. Color: incoloro.

4. DESCRIPCIÓN

El florfenicol es un antibiótico sintético de amplio espectro eficaz contra las bacterias Gram-positivas y Gram negativos. Actúa mediante la inhibición de la síntesis de proteínas a nivel ribosomal y es bacteriostático. Las pruebas de laboratorio han demostrado que el florfenicol es activo contra los patógenos bacterianos más comúnmente aislados implicados en la enfermedad respiratoria bovina que incluyen *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus* y *Arcanobacterium pyogenes*, y en contra de los patógenos bacterianos más comúnmente aisladas en las enfermedades respiratorias en los cerdos, incluyendo *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella multocida*.

5. INDICACIONES

Para el tratamiento preventivo y terapéutico de infecciones de las vías respiratorias en el ganado debido a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Haemophilus somnus*. La presencia de la enfermedad en el rebaño debe establecerse antes del tratamiento preventivo. Se indica, además, para el tratamiento de brotes agudos de la enfermedad respiratoria en cerdos causada por cepas de *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella multocida* sensibles al florfenicol.

6. ESPECIES DE DESTINO

Bovinos y porcinos.

7. ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular/subcutánea.

Optiflor 300

Página 2 de 2

8. DOSIS

- Bovinos:
 - Tratamiento (IM): 1 ml por 15 kg, dos veces en un intervalo de 48 h.
 - Tratamiento (SC): 2 ml por 15 kg de peso corporal, administrado una vez.
 - Prevención (SC): 2 ml por 15 kg de peso corporal, administrados una vez.
- Porcinos: 1 ml por 20 kg de peso corporal (IM), dos veces en un intervalo de 48 horas.

9. PRECAUCIONES

- No exceder la dosis recomendada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Consulte al Médico Veterinario
- No mezclar en la misma jeringa o envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.
- No manipular este producto si sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no trabajar con tales preparaciones.
- Agroveter Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.

10. CONTRAINDICACIONES

- No debe utilizarse en la producción de leche para consumo humano.
- No debe utilizarse en toros adultos o verracos destinados a la reproducción.
- No administrar en casos de reacciones alérgicas anteriores a florfenicol.

11. PERIODO DE RETIRO

Bovinos: Carne: 30 días (IM), 44 días (SC)

Cerdos: 18 días

12. ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente hasta 25°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado del alcance de los niños.

La eliminación debe ser de acuerdo con las regulaciones federales, estatales / provinciales y / o locales. La incineración es el método preferido de eliminación, cuando sea apropiado.

13. PRESENTACIÓN

El producto se presenta viales de vidrio, de 10mL, 20mL, 50mL, 100mL y 250mL de capacidad.