

CARDIODAN® 5

Tabletas Palatables

Inotrópico y Vasodilatador para la Insuficiencia Cardíaca Congestiva



Formulación

Cada tableta saborizada de 400 mg contiene: Pimobendan 5 mg; Excipientes c.s.p.1 tableta

Indicaciones

-Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) canina causada por una cardiomiopatía dilatada o una insuficiencia valvular (regurgitación de la válvula mitral y/o tricúspide). -Tratamiento de la cardiomiopatía dilatada (CMD) en perros de raza grande. Cuando se usa en casos de CMD en perros de raza grande, se prolonga significativamente el tiempo del establecimiento del ICC o de muerte súbita y resulta en la prolongación del tiempo de vida del animal. -Tratamiento de la CMD en el estadio preclínico (asintomático con aumento de los diámetros telesistólico y telediastólico del ventrículo izquierdo), principalmente en Dóberman Pinschers después del diagnóstico ecocardiográfico de la cardiopatía. -Tratamiento de perros con enfermedad mixomatosa de la válvula mitral (EMVM) en fase preclínica (asintomática con soplo mitral sistólico y evidencia de aumento del tamaño del corazón) para retrasar el inicio de los síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca.

Dosis y Administración

Vía oral. La dosis es de 0.25 mg/kg de peso corporal cada doce horas (mañana y noche) para una administración diaria total de 0.5 mg/kg (en la práctica ½ tableta de Cardiodan® 5 por cada 10-20 kg cada 12 horas). Se debe administrar una hora antes de las comidas.

Presentación Comercial

Caja x 10 tabletas, Caja x 30 tabletas, Caja x 60 tabletas,

Registro Senasa

Reg. SENASA Perú N.º 12103110021. Informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.