

## LIQUACEF C

### Polvo para Suspensión Oral

Antibiótico cefalosporínico de última generación con inhibidor de resistencia bacteriana y larga vida media



### Formulación

Cefpodoxime (como cefpodoxime proxetil) 10 mg, Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio) 6.25 mg, excipientes c.s.p 1 mL.

### Indicaciones

Para el tratamiento de infecciones cutáneas (heridas y abscesos) y tejidos blandos; neumonías, bronquitis, sinusitis, faringitis, tonsilitis y otras infecciones del tracto respiratorio alto y bajo; infecciones del tracto genito-urinario y otras causadas por gérmenes sensibles al cefpodoxime.

### Dosis y Administración

Preparación: Añada agua hasta la marca del frasco y agite, ya reconstituído, cada mL contiene 10 mg de cefpodoxime (como proxetil) y 6.25 mg de ácido clavulánico (como sal potásica). Deje reposar durante 5 minutos para asegurar una dispersión completa. Caninos: 1 mL por cada 1-2 kg (5-10 mg de cefpodoxime/Kg ) cada 24 horas por 7 días o hasta 3 días luego de la remisión de síntomas clínicos. Gatos: 1 mL por cada 2Kg (5 mg de cefpodoxime/kg) cada 12 horas o 1 mL por Kg (10 mg de cefpodoxime/kg) cada 24 horas hasta 3 días luego de la resolución del cuadro. Debe almacenarse en refrigeración (entre 2°C y 8°C) y puede utilizarse hasta por 7 días.

### Presentación Comercial

Frasco x 11g,

### Registro Senasa

SENASA Perù N.º 02-70-10144. Información informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.