

## OPTICLOX®

### Ungüento Oftálmico

Antibiótico de larga acción para el tratamiento de infecciones oculares



### Formulación

Cada jeringa de 5 g contiene: Cloxacilina (como cloxacilina benzatínica) 835 mg, Excipientes c.s.p. 5 g

### Indicaciones

Tratamiento de infecciones oculares diversas causadas por *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis* y otras bacterias susceptibles a la cloxacilina. Tratamiento de queratoconjuntivitis bovina en la que se sospeche o se prevea la presencia de bacterias susceptibles (incluida *Moraxella bovis*).

### Dosis y Administración

Opticlox® se administra por vía tópica ocular a razón de (cm. de pomada por ojo): Bovinos y equinos: aproximadamente 5 - 10 cm. Porcinos, ovinos, caprinos, camélidos: aproximadamente 5 cm. Perros y gatos: aproximadamente 2 cm. Abrir el párpado inferior e instilar un flujo constante de pomada en el saco conjuntival inferior. Normalmente se requiere una sola aplicación, pero el tratamiento puede repetirse después de 48-72 horas si es necesario. En animales con un solo ojo infectado se recomienda, para evitar la infección cruzada, tratar ambos ojos, tratando primero el ojo no infectado para evitar la transmisión de la infección. Cada jeringa debe utilizarse una sola vez.

### Presentación Comercial

Contenedor x 48 jeringas x 5 g,

### Registro Senasa

Perú: F.082.055.I.01063



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.