

PEN L.A.® 15/15

Suspensión Inyectable

Asociación penicilánica de larga acción



Formulación

Penicilina G benzatínica 15 000 000 UI, Penicilina G procaínica 15 000 000 UI, excipientes c.s.p. 100 mL.

Indicaciones

Para el tratamiento y control de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la penicilina y cuando se requiera una terapia de larga acción. Recomendada en casos de artritis, mastitis e infecciones gastrointestinales y de las vías respiratorias y urinarias causadas por microorganismos sensibles a la penicilina como los de los géneros *Campylobacter* spp., *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Erysipelothrix* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella multocida*, *Streptococcus* spp. y estafilococos penicilinasas-negativos.

Dosis y Administración

Vía intramuscular. Bovinos, Ovinos, Caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos y equinos: 1 mL por 25 Kg. Caninos, Felinos: 1 mL por 10 Kg. Una sola inyección, si fuese necesario repetir el tratamiento luego de 3 días.

Presentación Comercial

Frasco x 50 mL, Frasco x 100 mL, Frasco x 250 mL,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.82.85.I.0069



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.